

**AVERTISSEMENTS AGRICOLES****BULLETIN TECHNIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES RHONE-ALPES**

AIN, ARDECHE, DROME, ISERE, LOIRE, RHONE, SAVOIE, HAUTE-SAVOIE

**EDITION BAS-VIVARAIS****ABONNEMENT ANNUEL: 80 f**

REGISSEUR RECETTES D.D.A. CCP LYON 9431-17A

**Circonscription RHONE-ALPES 55, rue Mazenod 69426 LYON CEDEX 3**

31 Août 1984

N° de série continue 82

Bulletin n° 23

**POMMES GOLDEN - PROTEGER LA RECOLTE  
PAR UN TRAITEMENT FONGICIDE DE PRECUEILLETTE**

**ARBRES FRUITIERS**

=====

**POIRIER - POMMIER**

Carpocapse - L'activité de ce ravageur reste soutenue ; la protection doit être maintenue dans les vergers non récoltés en respectant scrupuleusement les délais d'emploi.

Maladies de conservation (rappel) - Ne négligez pas la protection. Un traitement deux jours avant le début de la récolte est conseillé.

REMARQUES / Certains produits risquent de laisser des taches sur les fruits  
La Tolyfluanide (METHYL-EUPARENE) est interdite 7 jours avant la récolte

**PECHER**

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| <u>Tordeuse Orientale</u> -      | ) Les préconisations de    |
| <u>Maladie de conservation</u> - | ) notre précédent Bulletin |
| <u>Oïdium</u> -                  | ) demeurent valables       |

**VIGNE**

=====

**TORDEUSE DE LA GRAPPE**

Le troisième vol d'Eudémis est commencé depuis quelques jours, mais son importance est faible ou nulle sauf dans le secteur VALLON PONT D'ARC - ORGNAC.

Une intervention préventive est conseillée dès réception dans cette zone de production mais seulement dans les vignes où l'Eudémis prédomine et se montre habituellement dangereuse.

Dans le cas d'une intervention plus tardive (de l'ordre d'une semaine), on utilisera un produit polyvalent (préventif et curatif).

**BOTRYTIS**

Trois semaines avant la récolte un dernier traitement est possible ; il n'est conseillé que dans les vignes à risque.

On utilisera pour cet éventuel traitement : RONILAN à 1,5 kg/ha ; ROVRAL à 1,5 kg/ha ; KIDAN à 3 l/ha ou SUMISCLEX à 1,5 kg/hl.

**BLACK-ROT**

En présence de la maladie la protection doit être maintenue.

7207